

Zerotens[®]

Voor de behandeling van
hoge bloeddruk, hypertensie.

Zerotens is een voedingssupplement met natuurlijke melkingrediënten

Zerotens bevat bijzondere natuurlijke melkingrediënten. In combinatie met een evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl, verlaagt Zerotens op natuurlijke wijze de bloeddruk.

Werkingsmechanisme

De melkingrediënten van Zerotens werken via het ACE (Angiotension Converting Enzyme) mechanisme. De melkingrediënten inhiberen op natuurlijke wijze ACE. Bovendien gebeurt deze inhibitie op een milde manier: de actieve locatie van het ACE enzyme wordt niet volledig geblokkeerd.

Door inhibitie van ACE wordt het ontstaan van een hoge bloeddruk voorkomen. Hoge bloeddruk wordt immers veroorzaakt door het vrijkomen van Angiotensin II, een proces waarbij ACE betrokken is. ACE helpt in de conversie van Angiotensin I naar Angiotensin II. Angiotensin II veroorzaakt vasoconstrictie. Deze samentrekking van de bloedvaten veroorzaakt een verhoogde bloeddruk.

Met Zerotens kan reeds vanaf de eerste week een bloeddrukverlaging vastgesteld worden. Na drie weken wordt een evenwichtstoestand bereikt.

Galenische vorm

Zerotens bestaat uit filmomhulde sliktabletten.

Gebruiksaanwijzing

De aanbevolen dosis bedraagt 4 tabletten per dag. Afhankelijk van de omstandigheden, kan

de aanbevolen dosis na 3 weken verminderd worden tot 2 tabletten per dag. Men neemt best 1 tot 2 tabletten 's morgens en 1 tot 2 tabletten 's avonds, telkens bij de maaltijd.

Contraindicaties en voorzorgen

Zerotens wordt afgeraden voor

- zwangere en borstgevendende vrouwen,
- kinderen onder de 5 jaar,
- personen met een allergie voor melkeiwit of lactose.

Bijwerkingen - Interacties met geneesmiddelen

Tot op heden zijn er noch bijwerkingen, noch interacties met geneesmiddelen bekend. Zerotens ondersteunt en vult het effect van bloeddrukverlagende geneesmiddelen aan. Patiënten die bloeddrukverlagende geneesmiddelen nemen, mogen Zerotens uitsluitend onder medisch toezicht gebruiken.

Laatste update: augustus 2006.

Innoceutics bvba

IIC Universiteit Gent
Technologiepark 3
9052 Zwijnaarde
België

www.innoceutics.com
contact@innocutics.com

Tel: + 32 (0)9 241 56 00
Fax: + 32 (0)9 241 56 56

Referenties

- Cadée JA et al., *A double-blind placebo controlled trial of four weeks administration of C12 Pepton effect in Taiwan shows the potential to lower blood pressure from a prehypertensive stage to a normotensive level.*, Am. J. Hyp. 2006, accepted for publication;
- Townsend RR, McFadden CB, Ford V and Cadée JA, *A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of casein protein hydrolysate in human essential hypertension*, Am. J. Hyp. 2004, 17:1056-1058.